A CURA DI FIMMG PALERMO

ALLEGATO 2

ISOLAMENTO: cosa fare?

In caso di **sintomi** suggerire l'immediato isolamento e l'esecuzione di un tampone, il **tampone antigenico negativo deve essere confermato da ulteriore tampone**

A TEST POSITIVO

ISOLAMENTO

VACCINATO*

- Dose Booster
- Completamento ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni
- Guarigione da meno di 120 giorni

ISOLAMENTO di 7 GIORNI + ASENZA DI SINTOMI DA ALMENO 3 GIORNI + TAMPONE molecolare o antigenico NEGATIVO

NON VACCINATO

ISOLAMENTOdi 10 GIORNI + ASENZA DI SINTOMI DA ALMENO 3 GIORNI + TAMPONE molecolare o antigenico NEGATIVO

B CONTATTO AD ALTO RISCHIO

conviventi, contatto fisico (stretta di mano), contatto con secrezioni, contatto fisico diretto (faccia a faccia) a meno di 2 metri e almeno 15 minuti, condivisione di un ambiente chiuso senza DPI, viaggio entro 2 posti in ogni direzione, compagni di viaggio e personale addetto alla sezione del positivo

ASINTOMATICO

DOSE BOOSTER CICLO PRIMARIO < 120 GG GUARIGIONE < 120 GG	CICLO VACCINALE PRIMARIO > 120 GIORNI + GREEN PASS VALIDO	NON VACCINATO CICLO PRIMARIO INCOMPLETO CICLO VACCIALE PRIMARIO < 14 GIORNI
AUTO SORVEGLIANZA PER 5 GIORNI + USO FFp2 per 10 giorni	QUARANTENA di 5 GIORNI dall'ultimo contatto + TAMPONE antigenico o molecolare NEGATIVO	QUARANTENA di 10 GIORNI dall'ultimo contatto + TAMPONE antigenico o molecolare NEGATIVO

SINTOMATICO

Fare subito tampone antigenico o molecolare

(+) → ISOLAMENTO

(−) → Ripetere tampone antigenico o molecolare al 5° giorno dall'ultimo contatto con positivo, se negativo fine autoisolamento

POSITIVO A LUNGO TERMINE

ISOLAMENTO DI 21 GIORNI DI CUI ALMENO 7 SENZA SINTOMI

CONTATTO A BASSO RISCHIO

- *contatto diretto a meno di 2 metri e per meno di 15 minuti;*
- *stare in un ambiente chiuso o viaggiare per meno di 15 minuti;*
- *tutti i passeggeri e l'equipaggio di un volo*

SE USO MASCHERINA CHIRURGICA O FFP2 DURANTE IL CONTATTO	NESSUNA MASCHERINA USATA DURANTE IL CONTATTO
NESSUNA QUARANTENA	SORVEGLIANZA PASSIVA

REINTEGRO LAVORATIVO

Esibire tampone antigenico o molecolare negativo

CONTATTI CONVIVENTI DI POSITIVI NON ADEGUATAMENTE ISOLATI

In relazione allo stato vaccinale, si applicano le indicazioni per i contatti stretti considerando come data di ultimo contatto la fine dell'isolamento del positivo ed effettuano un tampone preferibilmente molecolare al termine